



Naturmål for Fold 9

Dato for udarbejdelse: 14/01-2025

Dato for gennemgang med forpagter:

Evt. Revision:

Lokalitet

Folden er placeret på Kalvebod Fælled syd for Naturcenteret, mellem Granatvej og Kanalvej.

Formålet med naturforvaltningen på arealet

Formålet med naturplejen/afgræsningen er at bevare det åbne landskab uden vedagtig vegetation. Desuden skal afgræsningen være så hård, at den forhindrer arealet i at blive domineret af bjergørhvene, der tidligere har været meget dominerende på strandengene.

Den primære målsætning er, at bevare og forbedre forholdene for vadefugle, særligt brushøns og alm. ryle, men også at tage hensyn til de sjældne planter og padder der findes på strandengene.

Tilstand / beskrivelse af området

Arealet er inddæmmet i 1940'erne og dermed tidligere lavvandet havbund. Frem til 1990 blev der ikke foretaget egentlig naturforvaltning, så området udviklede sig til skov og krat samt med store tagrørsbevoksninger på de vådeste steder. Der er ryddet store arealer med skov og krat, og de hydrologiske forhold er forbedret ved tilkastning af grøfter.

Fold 9 er 22 ha. og beliggende på Kalvebod Fælled, hvilket er et område som er fuldt ud beskyttet under Natura 2000 på grund af dets unikke naturtyper og biodiversitet. Folden er desuden registreret som strandeng, hvilket betyder, at det er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Denne beskyttelse sikrer bevarelse af områdets særlige økologiske værdier og sikrer, at naturen forbliver intakt.

Fold 9 har på nuværende tidspunkt en HNV-score på 6, 7, 8 og 9 fordelt på arealet. Se kort.



Fokusarter

Alm. ryle

*Tekst: Er på
udpegningsgrundlaget*

*Er genindvandret som
ynglefugle efter 10 års
fravær.*



Brushøns.

*Er genindvandret som
ynglefugl efter 30 års
fravær*



Klyde.

*Er på
udpegningsgrundlaget.*

*Yngler på nyetablerede
yngleøer i Klydesø*



Grønbroget tudse.

Findes talrigt



Strandtudse

*Der er udsat ca. 3000 stk.
i 2018, 2019 og 2020,
hvor der også er etableret
mange paddehuller. I
foråret 2024 er der
registreret syngende
hanner*





Driftshistorie

Arealet har gradvist været under afgræsning fra 1990. KVL havde i starten belægnings- og raceforsøg i Klydesøområdet. Resultaterne viste, at en belægning på 1 Storkreatur/ha giver den bedste naturpleje, uden det går ud over dyrenes trivsel. Der er igennem tiden ryddet store arealer for skov og krat.

I fold 9 har der været afgræsset med robuste heste og kvægracer siden 90'erne. De seneste 15 år er arealet afgræsset med heste.

Forvaltningstiltag

Engene afgræsses primært med kvæg, men også i mindre grad med heste. Der er krav til dyreholderne om, at det skal være hårdfører kvægracer eller blandingsracer. Minimum 1 storkreatur pr. ha. i minimum 4 mdr. af vækstsæsonen. Normalt kommer dyrene på græs omkring 1. maj og hjemtages 1. dec. Der er fast læskur på arealet.

Tilskudsforbrug er ikke tilladt.

Hvis der er partier med bjergørhvene, forsøges de afbrændt om vinteren. Arealet affudses for tjørn og havtorn med års mellemrum. Der arbejdes løbende med at forbedre de hydrologiske forhold, ved tilkastning af grøfter, og ændring af grøfteprofiler.

For at minimere prædation på de jordrugende fugles æg og unger fra ræv, foretages der regulering af ræve af frivillige jægere, både i form af gravjagt fra rævekunstgrave, og i form af selektiv afskydning ved brug af kald.

Planteliste - indikator for naturtilstand

Soløje-alant || *Inula britannica*
Høst-borst || *Scorzonoides autumnalis*
Harril || *Juncus gerardii*
Kryb-hvene || *Agrostis stolonifera*
Almindelig hønsetarm || *Cerastium fontanum*
Fin kløver || *Trifolium dubium*
Hvid-kløver || *Trifolium repens*
Jordbær-kløver || *Trifolium fragiferum*
Smalbladet kællingetand || *Lotus tenuis*
Mælkebøtte || *Taraxacum officinale sensu lato*
Stivhåret ranunkel || *Ranunculus sardous*
Eng-rapgræs (underart) || *Poa pratensis subsp. pratensis*
Bjerg-rørhvene || *Calamagrostis epigejos*
Gul snorre || *Galium verum*
Blågrøn star || *Carex flacca*
Fjernakset star || *Carex distans*
Sylt-star || *Carex otrubae*



Rød svingel || Festuca rubra
Horse-tidse|| Cirsium vulgare
Liden tusindgylden || Centaurium pulchellum
Glat vejbrede || Plantago major
Strand-vejbrede || Plantago maritima
Fløjlsgræs || Holcus lanatus
Bladmoss (Bryopsida-klassen) || Bryopsida

Evaluerings

NST Evaluerings:

Græsningsstryket vurderes løbende, hvor en eventuelt partiel slåning af vedagtig vegetation afgøres.

Evaluerings via eksterne data:

Der kan indhentes data fra:

NOVANA overvågning.

HNV- og biodiversitetsscoren for arealet vurderes

Der indhentes data om sjældne arter fra pas på kortet, Biodiversitetskortet, fugleognatur eller artsportalen




Kort

Oversigtskort på luftfoto





Natura 2000 kort





HNV-kort

