



Bornholm
Ref. MEJHO
Den 16. juli 2024

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL FORPAGTNING RISPEBJERG

Kan arealerne betragtes som økologiske?

Arealerne er ikke i økologisk drift, men kan straksomlægges til økologi.

Når I skriver robuste dyr – hvad mener I så?

Der findes ikke nogen anerkendte robuste gederacer. Kødgeder som boergeden eller nordiske landgeder som dansk landrace, der både har dækhår og underuld er kendt for at klare sig bedst i et varieret klima med våde og kolde perioder. De fleste andre gederacer er sårbare i vådt og koldt vejr og har ofte behov for skur også i sommerperioden. Da der ikke er skur på arealet, accepteres andre racer som udgangspunkt ikke.

Alle fåreracer anses som robuste jf. dyrevelfærdsloven. Nogle racer er dog mere hårdføre. Dette gælder gotlandske pelsfår, gutefår, lüneburger, marskfår og spelzau.

Da forpagtningen giver mulighed for helårsgræsning med får, skal fårene være af en hårdfør type, der er kendt for at klare sig godt ude om vinteren.

Se dette faktaark om robuste racer:

<https://edit.mst.dk/media/jotaboxy/faktaark-om-robuste-husdyrracer2020.pdf>

Der skal anvendes nøjsomme dyr, der er egnede til og vant til at gå ude i hele græsningsperioden, og som er vant til at gå på næringsfattige naturarealer. Dyrene skal desuden have en pels og et huld, der gør dem egnede til at gå på arealerne i græsningsperioden.

Hvorfor vil I have robuste racer?

Vi stiller krav om robuste dyr for at få en mere ekstensiv græsning, hvor dyrene også gerne går på de grovere græsser samt træer og buske. De robuste racer kan bedre omsætte næringen fra de mere næringsfattige arealer og er bedre egnede til at modstå det skiftende vejr.

Hvorfor må dyrene ikke parasitbehandles på arealerne – og hvorfor skal de tilbageholdes?

Det er bevist, at medicin til parasitbehandling af husdyr har en negativ effekt på naturen.

Det skyldes at medicinen udvaskes fra pelsen og/eller udskilles i gødning og urin. På denne måde påvirkes fx de svampe og insekter, der er tilpasset livet i bl.a. husdyrgødning. Dels bliver gødningen uinteressant for insekterne, men medicinresterne kan også reducere insekternes udvikling og slå dem ihjel. Der er

fx målt påvirkning af insekters udvikling i kvæggødning op til 77 dage efter behandling.

Da formålet med forpagtningen er at forbedre biodiversiteten på arealerne, er udskillelse af medicinrester på arealerne derfor ikke foreneligt med formålet.

Dyrene skal derfor tilbageholdes fra arealerne så længe at risikoen for udskillelse af medicinrester er reduceret betragteligt.