

# Eftersøgning og afrapportering af rødlistede svampe i naturnationalparken Stråsø



Emil Christensen  
Erik Aude  
Rapport 2025-74

## Kolofon

Forfattere: Emil Christensen og Erik Aude

Rekvirent: Naturstyrelsen, Randbøl

Kontaktpersoner: Marianne Damholdt Bergin

Kvalitetssikring: Erik Aude og Lene Thomsen

Projektansvarlig: Erik Aude

Dokumenttitel: Eftersøgning og rapportering af rødlistede svampe i Naturnationalpark Stråso

Dokumenttype: Rapport 2025-74

Årstal: 2025

Sider: 26

Forsidefoto: Til venstre ses den truede Duft-ridderhat (EN), til højre den ligeledes truede Fyrre-skælrørhat (EN)

## Indholdsfortegnelse

Kolofon .....	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Resume .....	4
Afrapportering eftersøgning rødlistede arter i naturnationalparkerne.....	4
Udvælgelse af arter der blev eftersøgt .....	4
Udvælgelse af delområder der blev eftersøgt .....	5
Eftersøgningsmetode.....	8
Opsummering af resultater .....	9
Levestedvurdering .....	12
Potentielle trusler for arterne/levestederne .....	17
Anbefaling til af overvågning: .....	17
Vurdering af potentialet for tilstedeværelsen af rødlistede arter .....	17
Bilag .....	20

## Resumé

Ud af de 24 eftersøgte arter i naturnationalpark Stråsø plantage blev der fundet 14 rødlistede svampe, hvoraf to var kritisk truet (CR), syv var Truet (EN), fire var Sårbare (VU) og én næsten truet (NT).

Vejrforholdene var optimalt i ugerne op til feltundersøgelserne og under feltarbejdet.

## Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af en baseline over tilstedeværelse af truede arter og andre rødlistede arter, ønsker Naturstyrelsen at eftersøge de truede arter (kategorierne VU, EN, CR, RE) i udvalgte naturnationalparker.

Formålet med baselinekortlægningen at få er at få lave en anbefaling til den efterfølgende overvågning af udvalgte arter.

Oversigten over hvilke svampearter der skal eftersøges på de enkelte lokaliteter, fremgår af Bilag 1, Kravsspecifikationer i udbudsmaterialet.

Afrapporteringen herunder følger Naturstyrelsen standard skabelon.

## Afrapportering eftersøgning rødlistede arter i naturnationalparkerne

Naturnationalpark	Stråsø Plantage
Artsgruppe undersøgt	Svampe
Artsekspert	Emil Christensen
Kvalitetssikring foretaget af	Erik Aude
Data indtastet i Naturdatabasen i perioden	November 2025

## Udvælgelse af arter der blev eftersøgt

Tabel 1 Udvælgelse af arter til eftersøgning samt nyfundne arter i 2025. Senest fund kolonne er baseret på data tilsendt fra NST. Sorteret efter videnskabeligt navn


Videnskabeligt navn	Dansk navn	Rødliste kategori	Seneste fund	Eftersøgning (eftersøges, udeladt, aflyst)	Beskriv belæg (foto, indsamlet individ el. andet)
<i>Chromocyphella muscicola</i>	Mos-muslingeskål	VU	2023	Eftersøges	
<i>Cortinarius mucosus</i>	Kastaniebrun slørhat	VU	2022	Eftersøges	
<i>Cortinarius traganus</i>	Safrankødet slørhat	VU	2022	Eftersøges	Foto
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cinnober-grynhat	VU	2022	Aflyst	

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Rødliste kategori	Seneste fund	Eftersøgning (eftersøges, udeladt, aflyst)	Beskriv belæg (foto, indsamlet individ el. andet)
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	Orange korkpigsvamp	EN	2022	Eftersøges	Foto
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Blålig korkpigsvamp	CR	2016	Eftersøges	Foto
<i>Hydnellum cumulatum</i>	Intet dansk navn	CR	2017	Eftersøges	Foto
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rust-korkpigsvamp	VU	2023	Eftersøges	Foto
<i>Hydnellum peckii</i>	Bitter korkpigsvamp	EN	2025	Fundet (NY)	Foto
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>	Tørvemos vokshat	NT	2022	Eftersøges	Foto
<i>Leccinum vulpinum</i>	Fyrre-skælrørhat	EN	2017	Eftersøges	Foto
<i>Lyophyllum semitale</i>	Sværtende gråblad	EN	2022	Eftersøges	
<i>Neofavolus suavissimus</i>	Anishat	EN	2019	Eftersøges	Foto
<i>Phellodon niger sensu lato</i>	Mørk duftpigsvamp	VU	2017	Eftersøges	Foto
<i>Phellodon tomentosus</i>	Tragtformet duftpigsvamp	VU	2022	Eftersøges	Foto
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	EN	2012	Eftersøges	Foto
<i>Ramaria gracilis</i>	Anis-koralsvamp	VU	2022	Eftersøges	
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskælet kødpigsvamp	VU	2017	Aflyst	
<i>Thaxterogaster talus</i>	Knogle-slørhat	VU	2022	Eftersøges	
<i>Tricholoma apium</i>	Suppe-ridderhat	EN	2022	Eftersøges	Foto
<i>Tricholoma arvernense</i>	Kantet ridderhat	EN	2022	Aflyst	
<i>Tricholoma focale</i>	Halsbånd-ridderhat	VU	2014	Aflyst	
<i>Tricholoma matsutake</i>	Duft-ridderhat	EN	2023	Eftersøges	Foto
<i>Tricholoma sudum</i>	Tør ridderhat	EN	2020	Aflyst	

## Udvælgelse af delområder der blev eftersøgt


I eftersøgningen af rødlistede svampe er der taget udgangspunkt i tidligere fund af rødlistede svampe, som er fremsendt af NST. Data stammer fra forskellige kilder, med en del borgerobservationer på svampe.databasen.org.

Forekomsten af de tidligere registrerede rødlistede svampe viser 2 store hotspot områder, 1 mindre hotspot mod nord samt nogle mere enkeltstående fund (Figur 1). Endelig er der undervejs i eftersøgningen løbende undersøgt lovende og potentielle habitater for rødlistede svampe.




Figur 1 Oversigt over tidligere registrerede forekomster af rødlistede svampe tilsendt af NST

Overblik over undersøgte delområder fremgår af nedenstående to kort (Figur 2 og 3) samt Tabel 2.



Figur 2 Overblik over de undersøgte områder markeret med gult omrids. Nummeret i tilknytning til de gule polygoner angiver et løbnummer som anvendes i Tabel 2



Figur 3 Overblik over de undersøgte områder markeret med gult omrind. Det omtrentlige tidsforbrug fremgår i tilknytning til de gule polygoner

Tabel 2: Overblik over de undersøgte områder hhv. periode, vejr, tidsforbrug og potentiale for fund af rødlistede arter. Delområde nr. fremgår af Figur 2

Delområde nr.	Periode i 2025	Vejrforhold	Tidsforbrug (timer)	Potentiale for fund af rødlistede svampe
1	Medio august	Solrigt og let vind	5	Ja
2	Medio august	Solrigt og let vind	3	Ja
3	Medio august	Solrigt og let vind	22	Ja
4	Medio august	Solrigt og let vind	4	Ja
5	Medio august	Solrigt og let vind	10	Ja
6	Medio august	Solrigt og let vind	1	Ja
7	Medio august	Solrigt og let vind	4	Ja
<b>I alt</b>			<b>49</b>	

## Eftersøgningsmetode

De rødlistede svampe er opsøgt i felten med håndholdt GPS (Garmin Oregon 650t), hvor punkterne af tidligere registreringer af de rødlistede (EN, VU, NT og DD) svampe var overført. Alle arter der

noteres som "eftersøges" i Tabel 1, og deres tilhørende punkter blev opsøgt, og hvis ikke de blev fundet relativt kort tid efter ankomst til punktet, eller hvis der ved ankomst til punkt blev vurderet, at arten sandsynligvis ikke var umiddelbart i nærheden, blev der kigget på usikkerheden af fundne arter, ved at finde oprindelig registreringssted og information på [www.svampe.databasen.org](http://www.svampe.databasen.org). I tilfælde af en høj usikkerhed eller usandsynligt levested, blev et større område omkring punktet eftersøgt.

Efter at alle punkterne med rødlistede arter var blevet opsøgt, blev større områder gennemgået for at opsøge nye registreringer af rødlistede arter. Her blev der gennemgået lignende levesteder, som havde overlap med levestederne fra punktregistreringerne.

Der blev kørt i bil hen til nærmeste punkt og derefter foregik eftersøgningen til fods, hvor egnede levesteder på vej hen til punktet blev "trawlet" igennem. Dette for at finde nye egnede levesteder og ny registreringer af rødlistede arter.

Generelt set er delområderne der er undersøgt, arealmæssigt store, da levestederne ofte ligger tæt, evt. adskilt af et stykke vej eller et mindre areal med uegnet habitat. Derfor skal de indtegnede områder tolkes, som at eftersøgningen har fundet sted inden for de enkelte delområder, men at tiden er brugt på egnede levesteder i polygonen, og ikke i evt. uegnede habitater der ikke er skåret fra polygonen.

I de tilfælde, hvor artsidentifikation ikke kunne færdiggøres i felten, blev der hjembragt materiale til analyse i laboratorium. Navngivningen af svampene følger klassifikationen: <https://svampe.databasen.org/classification> samt Danmarks basiesvampe af Thomas Læssøe, Jens H. Petersen, Tobias Guldborg Frøslev og Jacob Heilmann-Clausen (2024).

For hver registrering af en art, er der taget UTM-koordinater, foto af levested samt identifikationsfotos, registreringsforhold såsom vejr og nedbør, antal frugtlegerer samt antal stammer og eventuelle bemærkninger.

Data er indtastet i Naturdatabasen med Naturstyrelsens bruger i november og december 2025, samt kvalitetssikret og sat til KS2 status i midten af december 2025.

## Opsummering af resultater


Tabel 3 Opsummering af resultater

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Chromocyphella muscicola</i>	Mos-muslingeskål	Ikke fundet		Formodentlig til stede	
<i>Cortinarius mucosus</i>	Kastaniebrun slørhat	Ikke fundet		Formodentlig til stede	

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Cortinarius traganus</i>	Safrankødet slørhat	Fundet	11 mycelier	>20 mycelier	Vidt udbredt med flere levesteder, særligt i delområde 3
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cinnobergrynhat	Ikke fundet		Formodentlig ikke til stede	
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	Orange korkpigsvamp	Fundet	7 mycelier	>20 mycelier	Udbredt i store dele af NNP
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Blålig korkpigsvamp	Fundet	1 mycelium	3-5 mycelier	Mindre område i NNP i delområde 3
<i>Hydnellum cumulatum</i>	Intet dansk navn	Fundet	3 mycelier	5-10 mycelier	Sjælden i NNP, kun registreret i delområde 3
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rustkorkpigsvamp	Fundet	1 mycelium	5-10 mycelier	Sjælden i NNP
<i>Hydnellum peckii</i>	Bitter korkpigsvamp	Fundet (NY)	1 mycelium	2-3 mycelier	Sjælden i NNP, kun i registret i vestlig del af delområde 3
<i>Leccinum vulpinum</i>	Fyrreskælørhat	Fundet	1 stort mycelium	2-3 mycelier	Sjælden i NNP, kun i registret i vestlig del af delområde 3
<i>Lyophyllum semitale</i>	Sværtende gråblad	Ikke fundet		Formodentlig til stede	
<i>Neofavolus suavissimus</i>	Anishat	Fundet	Enkelt mycelium på én stamme	3-5 mycelier	Sjælden i NNP, kun i registret i delområde 7
<i>Phellodon niger sensu lato</i>	Mørk duftpigsvamp	Fundet	8 mycelier	>20 mycelier	Vidt udbredt med flere levesteder, særligt i delområde 3
<i>Phellodon tomentosus</i>	Tragtformet duftpigsvamp	Fundet	9 mycelier	>20 mycelier	Vidt udbredt med flere levesteder, særligt i delområde 3
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	Fundet	1 mycelium	3-5 mycelier	Sjælden i NNP
<i>Ramaria gracilis</i>	Aniskoralsvamp	Ikke fundet		Formodentlig ikke til stede	
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskællet kødpigsvamp	Ikke fundet		Den er helt sikkert til stede, dog ikke fundet, sandsynligvis på grund af årstiden	

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Resultat (fundet, ikke fundet)	Bestand (antal individer/tuer mv)	Vurderet bestandsstørrelse	Vurderet udbredelse af levested lokalt
<i>Thaxterogaster talus</i>	Knogle-slørhat	Ikke fundet		Formodentlig mindre bestand	
<i>Tricholoma apium</i>	Suppe-ridderhat	Fundet	2 mycelier	3-5 mycelier	Kun registret i delområde 3
<i>Tricholoma arvernense</i>	Kantet ridderhat	Ikke fundet		Den er helt sikkert til stede, dog ikke fundet, sandsynligvis på grund af årstiden	
<i>Tricholoma focale</i>	Halsbånd-ridderhat	Ikke fundet		Den er sandsynligvis til stede, dog ikke fundet, sandsynligvis på grund af årstiden	
<i>Tricholoma matsutake</i>	Duft-ridderhat	Fundet	8 mycelier	>20 mycelier	Kun registret i delområde 3
<i>Tricholoma sudum</i>	Tør ridderhat	Ikke fundet		Den er helt sikkert til stede, dog ikke fundet, sandsynligvis på grund af årstiden	
<i>Tricholomopsis decora</i>	Sortskællet væbnerhat	Ikke fundet		Muligvis tilstede	

Figur 4 viser resultaterne af rødlistede svampe fundet i baseline undersøgelsen 2025



Figur 4 Forekomster af rødlistede svampe

## Levestedvurdering

Der er 6 hovedtyper af levesteder for de registrerede rødlistede svampe som gennemgås særskilt nedenfor. Alle de undersøgte områder, også hvis ikke der er fundet nogen rødlistede arter, har potentiale som levested.

1. Lysåbent tæt og urørt krat med både fyr og gran og rensdyrlaver
2. Gammel mosrig nålebevoksning med blanding af ældre fyr og gran
3. Lysåbne og næringsfattige sandede stier med en vis mængde forstyrrelse og bl.a. rensdyrlaver
4. Gammelt fugtigt pilekrat
5. Våd hede
6. Yngre, lidt fugtig bøg

### 1. Lysåbent tæt og urørt "klit" krat med både fyr, gran og rensdyrlaver

Flere af krattene havde forstyrrelser i form af vekselstier fra vildt, og som er hotspot for mange af de rødlistede svampe, der er tilpasset tør og sandet næringsfattig bund. I disse krat blev der registreret Safrankødet slørhat (VU), Duft ridderhat (EN), Suppe ridderhat (EN), Tragtformet duftpigsvamp (VU), Hydrellum cumulatum (CR), Orange korkpigsvamp (EN). Udbredelsen af denne type af levested er udelukkende fundet i delområde 3.



## 2. Gammel mosrig nålebevoksning med blanding af ældre fyr og med gran

Disse gamle driftede bevoksninger findes spredt i NNP, og her findes flere rødlistede arter, men særligt Safrankødet slørhat (VU) og Suppe ridderhat (EN) havde deres hovedudbredelse her.



3. Lysåbne og næringsfattige sandede stier med en vis mængde forstyrrelse og bl.a. rensdyrlaver  
Her blev den eneste registrering af Blålig korkpigsvamp (CR), Rust korkpigsvamp (VU), Violetbrun duftpigsvamp (EN) og Bitter korkpigsvamp gjort i NNP.



#### 4. Gammelt fugtigt pilekrat

Langs vandløbet i den nordlige ende af NNP, hvor der findes en mindre bestand af den truede Anishat (EN).



## 5. Våd hede

I tørvemos og blottet tørv på den våde hede, blev der registreret den mere eller mindre almindeligt forekommende Tørvemos vokshat (NT).



## 6. Yngre, lidt fugtig bøg.

Der er ikke meget løvtræ i NNP Stråsø, men i de lidt yngre bølgebevoksninger, blev der ledt efter Mosmuslingeskål (VU), som typisk er tilknyttet mosrige løvtræstammer. Desuden er det et oplagt levested for Knogle slørhat (VU), der også blev ledt efter i egnede bølgebevoksninger. Ingen af de to arter blev fundet i forbindelse med undersøgelsen



## Potentielle trusler for arterne/levestederne

Trusselvurderingen for de fundne arter og deres levesteder er opgjort fælles for alle levesteder og arter da der er overlap.

Den største trussel for de undersøgte delområder er skovning/udtynding og kørsel med tungt maskineri i det værdifulde hotspots særligt i delområde 1, 3, 4, 5 og 6. Levestedsforringelse af hotspotsne i form af udtynding, eller rydning frarådes på det stærkeste, da det er her flere af de rødlistede og kritisk truede arter har deres hovedudbredelsesområde, som f.eks. *Hydnellum cumulatum*, Blålig korkpigsvamp, Fyrre skælørhat og Duft ridderhat.

Arterne i de værdifulde hotspots har bedst af at forblive fuldstændig urørt og lade naturlige processer styre området.

En genskabelse af naturlig hydrologi ved lukning af dræn vil påvirke de rødlistede arter i enkelte af hotspotsne, da de fleste af de rødlistede arter i NNP Tranum er tilpasset tør bund, med undtagelse af Tørvemos vokshat og Anishat. Men hvis de naturlige processer genskabes, vil forstyrrelsen påvirke udbredelsen af arterne i en periode indtil, der indfindes et nyt naturligt udbredelsesområde.

Det er interessant at bemærke, hvor få vedboende og dødt ved tilknyttede rødlistede arter der findes i NNP, og det må formodes, at der i fremtiden, på grund af de kommende forvaltningstiltag, bliver skabt flere levesteder for de dødt ved tilknyttede svampe i NNP.

### Anbefaling til af overvågning:

Tabel 4 og 5 opsummerer forslag til overvågning. For alle arterne er det vurderet at populationsstørrelserne er store nok til at opretholde deres bestand i NNP Stråsø Plantage, såfremt at de tidligere nævnte potentielle trusler ikke forstyrrer arterne, samt at ingen af arterne er "en tilfældig strejfer".

### Vurdering af potentialet for tilstedeværelsen af rødlistede arter

Da svamperegistrering er afhængig af variable faktorer som både årstid, nedbør og varme, er det udfordrende at registrere samtlige mycelier af rødlistede svampe i et område over en kortere periode. Derfor er de fundne arter i denne baselineundersøgelse ikke en udtømmende liste af rødlistede svampe for NNP'en, men en grundig registrering af hvilke rødlistede svampe der var fremme i NNP'en i registreringsperioden.

Yderligere er der en "år til år" variation i svampe, hvor det ikke nødvendigvis er alle svampe, der danner frugtlegerer årligt. Et eksempel på en svamp, der med sikkerhed findes flere steder i NNP'en er Tør ridderhat (EN), men som ikke blev fundet i denne baselinemonitorering, da den først er fremme senere på sæsonen.

Det vurderes, at der er et stort potentiale for tilstedeværelsen af rødlistede svampe i NNP Stråsø der ikke er registreret i denne undersøgelse.

Tabel 4: Overblik over den samlede vurdering og anbefaling af overvågning





Videnskabeligt navn	Dansk navn	Indikator genskabte naturlige processer	Er arten tilknyttet området pga. specifikke krav til levested?	Moniteringsmulighed	Flagskibsart
<i>Cortinarius traganus</i>	Safrankødet slørhat	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Ja, forholdsvis sjælden på landsplan
<i>Hydnellum aurantiacum</i>	Orange korkpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, mager eller kalkrig nål	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Hydnellum caeruleum</i>	Blålig korkpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og gammel gran eller fyr	Ja	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Hydnellum cumulatum</i>	Intet dansk navn	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rust-korkpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Hydnellum peckii</i>	Bitter korkpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>	Tørvemos vokshat	Ja, naturlig hydrologi	Ja, fugtig blottet tørv eller tørvemos	Nej, for almindelig	Nej
<i>Leccinum vulpinum</i>	Fyrre-skælrørhat	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattigt fyr	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Neofavolus suavissimus</i>	Anishat	Ja, urørt skov og dødt ved	Ja, fugtigt og vådt pilekrat	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Phellodon niger</i>	Mørk duftpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Nej
<i>Phellodon tomentosus</i>	Tragtformet duftpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Nej
<i>Phellodon violascens</i>	Violetbrun duftpigsvamp	Ja, urørt skov	Ja, sandet og gerne kalkpåvirket gran	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Tricholoma apium</i>	Suppe-ridderhat	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nål	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan
<i>Tricholoma matsutake</i>	Duft-ridderhat	Ja, urørt skov	Ja, sandet og næringsfattig nåle	Ja, helt sikker	Ja, meget sjælden på landsplan





Tabel 5: Overblik over arter der ikke blev fundet og anbefaling til fremtidig monitorering





Videnskabeligt navn	Dansk navn	Bemærkning
<i>Ramaria gracilis</i>	Anis-koralsvamp	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover da den er sporadisk forekommende
<i>Cystodermella cinnabarina</i>	Cinnober-grynhat	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover da den er sporadisk forekommende
<i>Chromocyphella muscicola</i>	Mos-muslingeskål	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover da den er sporadisk forekommende
<i>Lyophyllum semitale</i>	Sværtende gråblad	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø
<i>Cortinarius mucosus</i>	Kastaniebrun slørhat	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø
<i>Tricholomopsis decora</i>	Sortskællet væbnerhat	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover da den er sporadisk forekommende
<i>Sarcodon squamosus</i>	Småskællet kødpigsvamp	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø
<i>Thaxterogaster talus</i>	Knogle-slørhat	Det lykkedes ikke at finde arter og det anbefales ikke at arten monitoreres fremover, da der er begrænset med levesteder i NNP Stråsø
<i>Tricholoma arvernense</i>	Kantet ridderhat	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø
<i>Tricholoma focale</i>	Halsbånd-ridderhat	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø
<i>Tricholoma sudum</i>	Tør ridderhat	Det lykkedes ikke at finde arten, men det anbefales at arten monitoreres fremover da den er karakteristisk for Stråsø





# Bilag





Tabel 1 Fotodokumentation og levested af fundne rødlistede arter



Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Safrankødet slørhat</b> (<i>Cortinarius traganus</i>)</p>		
<p><b>Orange korkpigsvamp</b> (<i>Hydnellum aurantiacum</i>)</p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Blålig korkpigsvamp</b> (<i>Hydnellum caeruleum</i>)</p>		
<p><i>Hydnellum cumulatum</i></p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Rust korkpigsvamp</b> (<i>Hydnellum ferrugineum</i>)</p>		
<p><b>Bitter korkpigsvamp</b> (<i>Hydnellum peckii</i>)</p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Fyrre skælrørhat</b> (<i>Leccinum vulpinum</i>)</p>		
<p><b>Anishat</b> (<i>Neofavolus suavissimus</i>)</p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Mørk duftpigsvamp</b> (<i>Phellodon niger</i>)</p>		
<p><b>Tragtformet duftpigsvamp</b> (<i>Phellodon tomentosus</i>)</p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Violetbrun duftpigsvamp</b> (<i>Phellodon violascens</i>)</p>		
<p><b>Suppe ridderhat</b> (<i>Tricholoma apium</i>)</p>		

Videnskabeligt navn	Close-up	Levested/habitat
<p><b>Duft ridderhat</b> (<i>Tricholoma matsutake</i>)</p>		
<p><b>Tørvemos vokshat</b> (<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>)</p>		