

Bilag 8 - Beskyttede fugle

I Natura 2000-planen for Gribbskov

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribbskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Levested	Bevaringsstatus	Bestandsvurdering	Målsætning	Trusler	Foreslåede tiltag	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Udpegningsgrundlag														
Hvepsevåge	<i>Pernis apivorus</i>	Udpegningsgrundlag for F108. Særligt prioriteret i Natura 2000. Fredet. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bernkonventionens liste II. CITES.	Høgefugl. I ældre løvskove over 100 ha. Reden i ældre træer i lysåbne områder. Fødesøgningen i våde områder i nærheden ¹ . Overvintrer i Afrika sept-maj ² .	DK: fåtallig i Danmark. Europa: ynglende i størstedelen af Europa ³ .	7-15 par ¹²	1.240,4ha ¹²	Gunstig ¹²	Yngler i et godt og stabilt antal ¹²	Mindst 10 par ¹²	—	—	Forstyrrelse er en trussel mod arten ³ . Sikres passende uforstyrrelse ved yngletræer ⁵ .	Undlade at færdes indenfor 200 m fra reden fra midt maj til midt juli ² .	Naturstyrelsen/ Naturstyrelsens Paspå-kort
Plettet rørvagtel	<i>Porzana porzana</i>	Udpegningsgrundlag for F108. Særligt prioriteret i Natura 2000. Forekomsten i Gribbskov er i særlig fokus. Næsten truet på rødlisten. Fredet. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bernkonventionens liste II.	I tæt til halvåben vegetation i fersk sumpet terræn, fx i overgangen ml. eng og rørskov ³ . Overvintrer i Afrika aug-maj ² .	DK: har tre kerneområderne, andre steder er spredte forekomster. Udbredelse ringe kendt da den sjældent ses ³ . Nogle mener ikke at den er tilstedeværende i Gribbskov på nuværende tidspunkt ¹³ . Europa: udbredt ³ .	0-1 par ¹²	160,7ha ¹²	Ukendt ¹²	Samme antal som året før ¹² .	Mindst 1 par ¹²	—	—	Arten kræver uforstyrret yngleområde ² .	Vandstand på 5cm om sommeren, ingen færdsel i yngleområdet ² .	Naturstyrelsen
Rødrygget tornskade	<i>Lanius collurio</i>	Nationalt betydelig bestand. Udpegningsgrundlag for F108. Særligt prioriteret i Natura 2000. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bernkonv. liste II.	I åbne, insektrige områder med bevoksning, fx overdrev med tjørn eller i skovbryn ³ . Stærkt territorial. Overvintrer i Sydafrika i aug-maj ² .	DK: Gribbskov er artens største enkeltlokalitet ⁶ . I nedgang i Østdanmark, men i fremgang i vestdanmark. Europa: findes i hovedparten af Europa. I nedgang ³ .	77-83 par ¹²	994,9ha ¹²	Ukendt ¹²	Stabil ¹²	Levesteder stabilt eller øget, så der er yngle- og fouragerings steder ¹² .	Tilgroning. U hensigtsmæssig drift ¹² .	Naturpleje såsom afgræsning, høslet og rydning af vedplanter ¹² .	—	—	Naturstyrelsen
Sortspætte	<i>Dryocopus martius</i>	Nationalt betydelig bestand. Særligt prioriteret i Natura 2000. Udpegningsgrundlag for F108. Fredet. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bernkonv. liste II.	Helst i ældre nåleskov med liggende dødt ved der grænser op til ældre løvskov. Vigtigste fødeemner er herkulesmyre og rød skovmyre ¹ .	DK: kerneområder i Midtjylland, Bornholm og Nordsjælland. Europa: Yngler i det meste af Europa ³ .	8,21 par ¹² . Sandsynligvis kun 3-6par ¹³ .	2.638,9ha ¹²	Gunstig ¹²	Yngler i et godt og stabilt antal ¹² .	Mindst 16 par ¹²	—	—	Forstyrrelse er en trussel mod arten ⁴ , der er relativt sky ³ .	—	Naturstyrelsen
Internationalt beskyttede														
Hvinand	<i>Bucephala clangula</i>	Fredet, må jages 1/10-31/1. Nationalt betydelig bestand i Gribbskov. Ansvarsart. Bernkonventionens liste III. På Bonn-konv. liste II.	Ved beskyttede kyster og i større søer. Rede i hule træer eller redekasser, nær søer og vandløb. Ynglende i Nordsjælland ³ , eller overvintrer i DK i november - marts/april ² .	DK: Stort set kun ynglende i Nordsjælland og udenfor København. Almindelig som rastende i hele landet. Redekasseprojekt ved Esrum Sø har hjulpet bestanden af hvinand betydeligt ⁶ . Europa: primært i Nordeuropa ³ .	Ca. 60 par ⁶ .	—	—	—	—	—	—	Kræver uforstyrrede fourageringsmuligheder nov-april ² . Potentielt følsom overfor forstyrrelse ¹¹ .	—	Naturdata/ DOFbasen

I Natura 2000-planen for Gribskov

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Levested	Bevaringsstatus	Bestandsvurdering	Målsætning	Trusler	Foreslåede tiltag	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Rød glente	<i>Milvus milvus</i>	Fredet. Nationalt betydelig bestand i Gribskov. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bonnkonventionens liste II. Bernkonventionens liste II. Danmark har en handleplan specifikt for rød glente.	Høgefugl. Lever af bl.a. padder og mindre fugle, gerne ådsler. Rede i mindre skove. Fouragering i det åbne land, fx ved levende hegn ⁷ . Evt som trækfugl ³ .	DK: ca. 40-50 par og er på nordgrænsen af udbredelsen ⁷ . Har haft stærkt varierende bestand i GS ⁶ . Europa: Udbredt syd for Danmark. Kerneområde i Tyskland, Frankrig og Spanien ⁷ .	1-2 par ¹³	—	—	—	—	—	—	Forstyrrelse af ynglesteder april-juni er en negativ faktor for artens ynglesucces ¹⁰ .	Skovdistrikterne sørger for at de ikke forstyrres af besøgende og arrangementer. Rede hemmelig for offentligheden ⁶ .	Naturstyrelsens Paspå-kort/DOFbasen.
Trane	<i>Grus grus</i>	Fredet. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bonnkonventionens liste II. Bernkonventionens liste II. CITES.	I både åbne og tilgroede moseområder, og som er uforstyrrede. Sky art. Fouragering også i engområder. Rede på vanddækkede arealer. Trækfugl. I Danmark marts-sept ² , ellers i Spanien og Nordafrika ³ .	DK: omkring 99-113 par, på flere lokaliteter, men ærligt i Nordjylland. I Fremgang. Europa: i det nordøstlige Europa ³ .	—	—	—	—	—	—	—	—	Undlade at færdes indenfor 300 m fra reden fra marts til midt juli ² .	Jens Ole Andersen
Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Bonnkonventionens liste II. Bernkonventionens liste II. Fredet. CITES.	Lever ved vandområder. Reder i store træer, især gammel skovfyv. Lever af fisk. Er i Danmark i apr-maj og aug-sept. Overvintrer i Afrika ² .	DK: under 10 par ² .	—	—	—	—	—	—	—	Forstyrrelse. Mangel på levesteder ² .	—	Jens Ole Andersen
Fredede														
Duehøg	<i>Accipiter gentilis</i>	Fredet.	Yngler i større, højstammede nåle- og løvskove. Lever relativt skjult. Både stand- og trækfugl. Tager mindre pattedyr, og fugle af due- og skovskadestørrelse ³ .	DK: Relativt alm, og ret udbredt. Stabil ⁸ . Europa: vidt udbredt i den nordlige, tempererede del ⁷ .	3 par ¹³ .	—	—	—	—	—	—	Sårbar overfor forstyrrelse i redebygnings- og æglægningsperioden ¹¹ .	—	Naturstyrelsens Paspå-kort/DOFbasen
Lille flagspætte	<i>Dendrocopos minor</i>	Fredet. Næsten truet på rødlisten. Karakterart for Gribskov ³ .	Redehul og fødesøgning primært i dødt ved af løvtræ, ofte i skove uden intensiv drift. Søger også føde i rørskov. Areal krav er 1km ² optimal skov pr par. Æglægning i maj. Klækning i slut juni-start juli. Standfugl. Evt. kun vinterophold i Danmark ³ .	DK: Spredt forekommende på Bornholm, Sjælland og Lolland. I øvrigt sjælden. I fremgang ⁸ . Europa: Yngler i størstedelen af Europa. Større bestande i Norden, som er gået tilbage pga intensiv skovdrift ³ .	Ca. 5 par ⁶ .	—	—	—	—	—	—	Intensiv skovdrift ³ .	—	DOFbasen
Musvåge	<i>Buteo buteo</i>	Fredet.	Yngler i skove og lunde, og jager i åbent land. Bredt fødegrundlag. Kan være meget aggressiv i territorieforsvar. Træk- og standfugl ³ .	DK: Almindelig og udbredt. Mest udbredte rovfugl. Bestand stabil siden 1980 ² . Europa: udbredt i det meste af Europa ³ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Naturstyrelsens Paspå-kort/DOFbasen

I Natura 2000-planen for Gribskov

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Levested	Bevaringsstatus	Bestandsvurdering	Målsætning	Trusler	Foreslåede tiltag	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Ravn	<i>Corvus corax</i>	Fredet. Karakterart for Gribskov ³ .	Yngler i gamle løvtræer, evt også i nåletræer. Søger primært føde i det åbne land. Altædende. Livsvarig mage, veksler mellem et antal reder fra år til år. Intelligent, sky og vagtsom. Overnatter på overnatningspladser med artsfæller. Standfugl ² .	DK: Talrig på Fyn, og i Syd- og Østjylland. Findes også på Sjælland og Bornholm. I fremgang siden 1960 ² . Europa: Yngler i det meste af Europa ³ .	Ca. 15 par ⁶ .	—	—	—	—	—	—	—	—	DOFbasen
Svaleklire	<i>Tringa ochropus</i>	Fredet. Nationalt betydelig bestand i Gribskov. Sårbar på rødlisten. Karakterart for Gribskov ³ .	Yngler i åbne skovmoser i nåle- og blandskov. Udenfor yngletiden i åer, kyster m.m. Æglægning sidst i april, klækning midt i maj. Trækker ca. juli-marts ³ .	DK: Yngler primært i Nordøst- og Midtsjælland. Derudover spredt ³ . GS har Danmarks største bestand ⁶ . Europa: i Tyskland, Polen og østpå.	Ca. 20 par ⁶ .	—	—	—	—	—	—	—	—	DOFbasen
Skarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Fredet. Nationalt ansvarsart. Bern-konventionens liste III. Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4.2. Må skydes ved fiskeredskaber og dambrug, hvis de ikke kan bortskræmmes.	Underarter Mellemskarv og Storskarv ⁹ . Hovedparten af bestanden er i DK i marts-okt, og overvintrer i Mellemeuropa. Fiskeæder ² .	DK: Stor og stabil bestand ⁸ . Europa: Ynglende. Omkring 30% af den europæiske bestand yngler i DK ⁹ .	—	—	—	—	—	—	—	Forfølgelse ⁸ .	Fredning. Regulering nær fiskeri ² .	Jens Ole Andersen/DOFbasen
Troldand	<i>Aythya fuligula</i>	Fredet, må jages 1/10-31/1.. Bern-konventionens liste III. Bonn-konventionens liste II. Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4.2. Potentielt fremtidigt udpegningsgrundlag for F108.	Inaktive i dagrastepladser om dagen, og i fourageringsområde om aftenen. Lever af bl.a. muslinger, snegle og orm ² .	DK: Almindelig, udbredt. Stigende bestand ⁸ . Rastende i DK indtil marts-april ² . Europa: udbredt, især i den nordlige del ⁴ .	—	—	—	—	—	—	—	Færdsel til vands på dagrastepladserne ² .	Begrænset færdsel ved dagrastepladser okt - midt marts ² .	DOFbasen
Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>	Fredet. Bern-konventionens liste II. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Potentielt fremtidigt udpegningsgrundlag for F108.	Ved klare og rene søer og vandløb med rig fiskefauna. Yngler i redehul i jord- og lerskrænter. Mange overvintrer sydpå ² , men svenske individer overvintrer ofte i DK. Sky ³ .	DK: Fåtalig, spredt forekommende, flest i Midtjylland. Gunstig bevaringsstatus, da den er i fremgang i DK ⁸ . Europa: Udbredt. Stabil eller i nedgang ³ .	—	—	—	—	—	—	—	Manglende levesteder. Rekreation/turisme ⁸ . Sårbar overfor forstyrrelser ved ynglestederne og dagrastepladserne ² .	Tilstedeværelse af eroderede åskrænter. Ro ved yngleområder. Forekomst af træer langs bredden ² .	DOFbasen

I Natura 2000-planen for Gribskov

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Levested	Bevaringsstatus	Bestandsvurdering	Målsætning	Trusler	Foreslåede tiltag	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Hedelærke	<i>Lullula arborea</i>	Fredet. Næsten truet på rødlisten. Bernkonventionens liste III. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Potentielt fremtidigt udpegningsgrundlag for F108.	Hedelignede områder med spredte træer, evt også rydninger i nåleskov. Overvintrer i Sydvesteuropa i okt-marts ³ .	DK: Fåtalig og spredt i Jylland, ellers sjælden. Gunstig bevaringsstatus. Tilsyneladende stabil bestand ⁸ . Europa: Vidt udbredt ³ .	—	—	—	—	—	—	—	Intensiv landbrugsdrift ⁴ .	Tilstedeværelse af egnede levesteder ² .	DOFbasen

Kilder: 1: Skov- og Naturstyrelsen 2007. 2: Naturstyrelsen 2011a. 3: Dansk Ornitologisk Forening 2011c. 4: By- og Landskabsstyrelsen 2009. 5: Naturstyrelsen 2011b. 6: Rune 2009. 7: Dansk Ornitologisk Forening 2011c. 8: Wind & Pihl 2010. 9: Skov- og Naturstyrelsen 2002. 10: Dansk Ornitologisk Forening 2004. 11: Tind & Agger 2003. 12: Naturstyrelsen 2011k, Skov- og Naturstyrelsen 2007, Frederiksborg Amt 2006. 13: Per Ekberg Pedersen.