

Bilag 9 - Beskyttede pattedyr

Gribskov

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Bestandsvurdering	Trusler	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Internationalt beskyttede										
Brunflagermus	<i>Nyctalus noctula</i>	Fredet. Habitatdirektivets bilag IV. Sårbar på rødlisten i 1997.	Vinterkvarterer i hule træer eller bygninger, sommerkvarterer i hule træer. Jager over skov, mark og søer. Parring i sensommeren, føder i juli ¹ . Trækker formentlig ud af landet af og til ² .	DK: Forholdsvis almindelig i det meste af landet, bortset fra Vest- og Nordjylland. Formegentlig stabil bestand. Europa: udbredt ³ .	—	—	—	Træfældning og beskæring af rastetræer ³ . Særligt kolde vintre. Forstyrrelser ¹ .	Ikke forstyrres aug-juni. Ikke kunstigt lys nær indgangen. Uhindret adgang og begrænset færdsel af menn. ved vinterkvarterer ¹ .	DOFbasen
Damflagermus	<i>Myotis dasycneme</i>	Fredet. Habitatdirektivets bilag IV. Sårbar på rødlisten. Den danske bestand er en af de tre største.	Jager insekter over vandflader, evt over lave buske og rørbrømmer. Udflyvning i april. Føder en unge i slut juni-start juli. Parring i mellem- eller vinterkvarterer i slut aug-nov. Vinterdvale starter i slut sept-nov.	DK: Udbredt i det østlige Jylland og Limfjordsområdet. Desuden små, spredte bestande. Tilsyneladende ikke i tilbagegang. Ikke fundet i Gribskov i 1974-2004 ⁴ , men ved en artsovervågning i 2006. Europa: Begrænset udbredelse ³ .	—	—	—	Ødelæggelse og forurening af søer, vandløb, fjorde. Fjernelse af ledelinjer i landskabet. Forstyrrelse ³ .	Ikke forstyrres aug-juni. Ikke kunstigt lys nær indgangen. Uhindret adgang og begrænset færdsel af menn. ved vinterkvarterer ¹ .	Naturdata
Fredede										
Dådyr	<i>Dama dama</i>	Fredet, må jages 1/9-31/1. Kan reguleres som skadevoldende vildt.	I mosaik af løv- og blandingskov med rig bundvegetation, og på græsarealer og marker. Brunst okt-nov. Kalvesætning i maj-juni ⁵ .	Introduceret art. DK: Forekommer over hele landet, dog i varierende grad. Største bestand i Jægersborg Dyrehave ⁵ . Lever om vinteren mest i nordlige og centrale del af Gribskov hvor de fodres og har brunstpladser, øvrige måneder i hele skoven ⁶ .	1.000 dyr ⁶ .	—	—	Jagt ⁵ .	—	Naturstyrelsen
Grævling	<i>Meles meles</i>	Fredet. Bern-konventionens liste III.	Grave i løv- og blandingskov. Søger føde i landbrugsområder, enge m.m. Nataktive. I graven i dagtimerne. Parring marts-dec. Føder midten af januar til midt marts. Unger kommer ud efter 2 mdr ⁷ .	DK: Udbredt, men tætheden størst i Østjylland. Generelt i stigning, men i nedgang i en række skove med stor publikumsbelastning ⁷ . Vidt udbredt i Europa, hvor den formentlig er stabil.	36 grave.	I fremgang ⁶ .	Trafikdrab, intensiv skovdrift, forstyrrelse ⁶ .	Trafikdrab, intensivering af arealanvendelse ³ . Forstyrrelse ⁶ .	—	Naturstyrelsen
Krondyr	<i>Cervus elaphus</i>	Fredet, må jages 16-30/11 i Region Hovedstaden. Kan reguleres som skadevoldende vildt. Fra NSTs side er der håb for etableret bestand i Gribskov.	Primært i skove og plantager. Fødesøgning især på åbne arealer. Fødesøgning oftest mellem solnedgang og solopgang pga jagt og forstyrrelser i dagtimerne. Brunst i august. Kalvesætning i juni. Sæsonbestemte vandringer, og parring i brunst- og vinterområderne ⁸ . Tilpasningsdygtige ⁹ .	DK: I Danmark udbredt i Jylland og i dele af Sjælland. Findes vildt og i dyrehaver og hjortefarme. Bestanden er stabil eller stigende ³ . I Gribskov ses dyr i hele Harager Hegn der er strejfende flokke fra Tisvilde Hegn ⁶ . Europa: Udbredt.	—	—	—	Jagt og anden forstyrrelse ⁸ . Trafikdrab ⁹ .	—	Naturstyrelsen

Art	Latinsk navn	Beskyttelse og betydning i Gribskov	Biologi	Udbredelse	Antal	Bestandsvurdering	Trusler	Generelle trusler	Generelle tiltag	Kortdatakilde
Rådyr	<i>Capreolus capreolus</i>	Fredet, må jages 16/5-15/7 og 1/10-31/1. Kan reguleres som skadevoldende vildt.	Helst i områder med veksling ml. skov og dyrket mark. Brunst fra juli-aug. Kalvesætning i maj-juni. Territoriehævdende hanner i sommerperioden. Tilpasningsdygtige ¹⁰ .	DK: Udbredt i hele landet. Tætteste bestande på øerne, Bornholm og Østjylland, på rig jordbund med godt fødegrundlag. Kraftig fremgang, så den nu er almindelig ¹⁰ . Lever spredt i hele Gribskov, men søger mest føde i yderkanterne ⁶ . Europa: Vidt udbredt ¹⁰ .	Omkring 1.000 dyr ⁶ .	—	—	Særlig høj grad af forstyrrelse. Svælgbremser (parasit) ¹⁰ .	—	Naturstyrelsen
Sika	<i>Cervus nippon</i>	Fredet, må jages 1/9-31/1.	Brunst i sept-dec. Kalvesætning oftest maj-juni. Sky. Oftest aktive i dagtimerne, men evt om natten pga jagt om dagen ¹¹ .	DK: Meget begrænset udbredelse, kun spredte bestande i Jylland og på Sjælland ¹¹ . I Gribskov findes de mest i den centrale del, hvor de har brunstpladser ⁶ . Europa: Udbredt ¹¹ .	50 dyr ⁶ .	—	—	Jagt og forstyrrelse ¹¹ .	—	Naturstyrelsen
Egern	<i>Sciurus vulgaris</i>	Fredet. Bern-konventionens liste III.	I nåle- og blandskove, løvskove, haver m.m. Rede oftest i nåletræer. Kuld i marts-april, og evt i juli-august ¹ .	DK: Vidt udbredt, almindeligt. Europa: Vidt udbredt ¹² .	—	—	—	Fragmentering af skovområder. Negative ændringer i driftform, træarter og skovstruktur ¹² .	Korridorer mellem skovene. Øget skovareal ¹² .	DOFbasen

Kilder: 1: Naturstyrelsen 2011a. 2: Baagøe & Jensen 2007a. 3: Wind & Pihl 2010. 4: Baagøe 2007b. 5: Asferg & Madsen 2007a. 6: Rune 2009. 7: Madsen, Aaris-Sørensen & Asferg 2007. 8: Asferg & Madsen 2007c. 9: Tind & Agger 2003. 10: Asferg & Madsen 2007d. 11: Asferg & Madsen 2007e. 12: Asferg & Madsen 2007b.