

Biag 9. Oversigt over antallet af ynglefugle (par) 1955-99 for udvalgte arter

Rød- liste	Art	kilde: N. Mardal Jensen				kilde: DOF						kilde: Kbh. Amt				
		1955	1960	1965	1970	1970	1980	1992	1993	1994	1995	1995	1996	1997	1998	1999
	Lille Lappedykker		3	2	4	5-15	1-2	16-22	24-30	21-28	21-27	2-8	1-4	0-4	3-6	6
	Tp. Lappedykker						2			3	1-2	3	1	1	1-3	3-4
	Gråstr. Lapped.					0-1		28-36	23-32	27-35	22-35	6-10	8-12	6-9	6-12	19-20
	Sorth. Lappedykker							0-1	0-1							
	Knopsvane		1	3	5	2-3	6	6-8	7-8	10-12	8-9	5	4	5-7	15-17	10-12
	Grågås				5	2-5	35-40	8-9	16-19	12-14	12-13	10	8	5	5	15-16
	Gravand	50	75	40	25	3-5	15-60	1-12	2-5	1-4	1-4	3-4	0-3	0-4	0-6	1-2
	Pibeand											0	0	0	0-1	0-1
	Knarand							0-1	0-1			0	0	0	0-2	0-2
	Krikand		1			0-1		0-1		0-2	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1
	Gråand	100	175	100	150	5-10	30	42-57	15	40-50	16-38	≥4	≥3	?	?	≥41
	Spidsand				1	0-1	1-2					0	0	0	0	1-2
V	Attingand	1	3	3	5	0-1	1-2	0-1	0-1		0-1	0	0-1	1	2	2-3
	Skeand		3	8	10	2-3	15	0-1	1	0-2	1-2	0-1	0-2	1-3	0-7	6-8
	Ederfugl	1	2	30	30	10-30	25	6-8	6	11	11	10	7	0-9	0-4	0-2
	Tp. Skallesluger	2	4	4	8	3-7	7	0-1	2	0-2	1-2	0-2	0-2	0-2	0-4	2-3
	Rørhøg				2	0-1	1-3			1	1	0	0	1	0	0
	Spurvehøg						1	0-1	2-3	1-3	5-6					
	Tårnfalk			1	4	3-5	3-6	2-3	5-6	3-5	5-7					
	Vandrikse	1	1	2	8	2-10	12	19	6-7	4	6	0-3	0-2	0-2	0-2	0-4
	Blishøne	3	30	30	70	25-70	200	62-89	82-100	76-87	62-98	20	26	35	45	62
	Strandskade	10	35	50	80	75-100	100	32-40	32-39	30-33		26-27	21-22	16	19	22-25
A	Klyde	3	75	15	20	10-150	10	3	2-3	5-6	4-5	4-5	7	10-11	7-9	8-12
	Stor Præstekrave	50	25	5	15	5-20	5-7	0-1	3-4	5-6	5	2	2-4	2-4	6-7	11
X	Vibe	200	300	125	200	225-350	250	55-67	54-72	54-57	72-74	65-66	63-65	39-41	60-65	74-89
R, A	Alm. Ryle (sydl. race)		2	20	25	5-10	3-5	7-8	4	7	4	4-5	2-5	2	0-1	1
	Brushane	6	15	20	15	15-40	8-20		0-2			0	0	0-1	0	0
	Dobbeltbekkasin	2	2	15	20	15-25	15-40	48-54	35-36	65-73	54-61	≥2	?	≥2	?	?
	Stor Kobbersnepe				0-1	0-1	0-1									
	Stor Regnspove						1		1-2	0-1		0	0	0	0	0
X	Rødben	50	175	125	125	50-175	50-75	32-40	29-39	31-33	30-33	24-28	22	22-27	32-33	45-52
	Hættemåge	200	5000	7000	7000	3000	3000					0	0	3-4	4-5	16
	Stormmåge	500	7000	7000	7000	5000	2700-2800	2	5	5	5	5	4	5-6	3-9	7-9
	Sølvmåge	10	50	250	500	500	75-100	10	7	2-9	6	6-7	7	1-3	0-2	0-2
	Splitterne				50	1										
	Fjordterne	5	200	30	5	25-75										
	Havterne	20	600	500	300	300-600	20-200					0	0	1	0-1	1
	Mosehornugle		0-2	0-2	2-4	2-4	1-4									
	Gul Vipstjert					3	2	5-6	8-9	6-7	2	0	0	0	0	2
	Græshoppesanger							142-144	48	36	122-145	?	?	?	?	?
	Sivsanger	talrig				20-30	10	5	0-1	0-1						
	Skægmejse									0-1	1-2					

Bilag 9. Optællinger af ynglende og rastende fugle

Bilaget giver en oversigt over antallet af rastende fugle i perioden 1970-99 samt antallet af ynglefugle (par) i perioden 1955-99. Tallene for rastende fugle er til og med 1995 hentet fra DOF's lokalitetsregistrering, medens der for 1995-99 er vist tal fra tællingerne for Skov- og Naturstyrelsens Reservatsektion (indtil marts '98 v. opsynsmand N. Mardal Jensen). Ynglefugletallene er også hentet fra flere kilder: Reservatsektionen, DOF og Københavns Amt.

Områdets **ynglefugle** blev i årene 1951-72 registreret af N. Mardal Jensen og indrapporteret til den daværende statens Vildtbiologiske Station. I forbindelse med projekt "Fuglenes Danmark" har DOF sammenstillet optællinger af ynglefugle og rastende fugle i perioden 1970-95. Københavns Amt har siden 1990 sørget for optælling af ynglepar af udvalgte arter først og fremmest i Klydesøområdet, ved Hejresøen og på Koklapperne (disse dellokaliteter går næsten uændret igen hvert af årene 1995-99, og de tilhørende tællinger er derfor indført summeret i tabellen). Hvor Amtets naturovervågning altså fokuserer på udvalgte – især strandengstilknyttede – arter i disse afgrænsede områder, dækker optællingerne fra N. Mardal Jensen og DOF hele området syd for Vejlands Allé og vest for landkanalen. Ved sammenstillingen af data fra de 3 kilder giver forskelle i metodik og afgrænsning af optællingsområder nogle usikkerheder mht. bestandsudviklingen, men alligevel vurderes materialet at være et godt billede af den reelle udvikling. I oversigten kan evt. niveauforskelle ses via repræsentation af begge kilder i årene med overgang til ny kilde (1970 og 1995). Bemærk dog, at der i hvert fald indenfor årene 1995-99 også har forekommet indbyrdes lettere afvigende optællingsmåder.

Tal for **rastende** fugle er de registrerede årlige maksima. DOF har bygget på flere månedlige tællinger, dækkende hele området syd for Vejlands Allé og vest for landkanalen. For Reservatsektionen er der talt tilfældige dage, typisk 1 gang/måned. Hele det førnævnte område er efter det oplyste dækket i tællingerne fra 1995 (som vises for at afsløre niveauforskelle) og 1996, medens der fra 1997 og frem kun foreligger tal for "Klydesøen" plus "Brakvandssøen" (området for Klydesøens udvidelse). Tallene for 1998 skal tages med det forbehold, at der ingen april-tællinger var. I øvrigt må de opgivne tal betragtes som noget usikre grundet optæller-skifter og tvivlsomme stedbetegnelser i datahåndteringen.

Følgende gængse forkortelser for rød- og gullistede arter er benyttet:

E : akut truet

V : sårbar

R : sjælden

X : hensynskrævende

A : særligt ansvarskrævende

Med fed skrift er markeret de ynglearter, som er "Liste I"-arter.

Vestamager

Rastefugle, årligt observeret maksimum

	1970	1980	1992	1993	1994	1995	1995	1996	1997	1998	1999
Lille Lappedykker	15		13	43	30	47	22	36	22	37	
Gråstrubet Lappedykker			40	50	44	55	≤22	≤14	≤19	≤49	
Fiskehejre		35	35	27	34	40	30	18	19	57	
Knopsvane			16	14	47	15	90	150	70	108	
Pibesvane					3	12	12	7	5	5	
Sangsvane			16	8	10	14	14	3	37	27	
Grågås	220		16	99	140	90	90	54	70	209	
Canadagås			30	28	46			2	12	45	
Gravand	75	180	34	17	14	18	18	9	34	34	
Pibeand	700	300	37	105	560	76	76	340	320	122	14
Krikand	2500	1100	625	370	314	254	254	285	1500	989	6
Gråand	2000	500	262	517	294	209	208	300	325	600	5
Spidsand	15	10	4		16			9	46	45	
Atlingand	10		4	4	2	6	3	6	12	10	
Skeand	100	25	4	14	28	11	10	15	80	162	1
Taffeland			60	75	64	100	34	46	12	22	
Troldand	2000		4025	3000	5400	5000	2712	2500	900	280	4
Bjergand			6	45	68	2		14			
Ederfugl		60	12	25	21	35	100	80	27	12	
Hvinand			12	4	65	15	40	530	60	60	
Lille Skallesluger			10	16	11	7		16		12	
Toppet Skallesluger		15	7	4	7	2	46	56	17	18	
Stor Skallesluger	200	30	3	6	203	505	600	29	80	67	
Blishøne				82	102	240	645	70	215	540	5
Strandskade	100	160	38	20	47	33	27	32	20	9	
Stor Præstekrave	25	100	1	3	4	7		20	18	240	
Hjejle	3000	200	2	49	1	15			30	1	
Strandhjejle	35	80		2				14	4	7	
Vibe	2500	400	145	65	80	143	52	66	340	280	2
Almindelig Ryle	200	400	20	74	40	130	54	50	140	365	10
Kærløber	10										
Brushane	40	30	9	32	25	13	12	19	44	289	
Enkeltbekkasin			1			1					
Dobbeltbekkasin	25	100	65	33	30	37		16	12	225	
Lille Regnspove	25	15		4	18	2		7			
Stor Regnspove	75	150		21	21	3		23		8	
Sortklire	1	15	2		7			4	2	42	
Rødben	50	150	36	16	57	31	26	16	68	53	
Hvidklire	60	50	6	14	13	30	21	10	48	77	
Svaleklire	10		1	1	2	17				≤84	
Tinksmed	50	40	3	3	10	20					
Mudderklire	30		11	5	9	23				≤84	
Sjagger	5000	5000	640	1100	600	800					

RASTEFUGLE-OPTÆLLINGER

1995-1996: Angiveligt er hele Vestamager indbefattet. For 1996 mangler 1. kvartal (islagt?), og der er nogle uforklarede ekstra indberetninger af blishøns pr. 18/10 og 26/11 (hvor tælledagene i øvrigt var 13/10 og 16/11).

1997: Januar-september er der tilsyneladende 2 selvstændige, additive skemaer for hhv. Brakvandsøen og Klydesøen. Men også "tilfældigt" ens værdier, der giver mistanke om afskriftsfejl. Oktober-december haves derimod kun "Brakvandssøen", som her vist nok inkluderer Klydesø.

1998: Januar-marts er vist nok en samlet tælling ligesom september. Resten af året er der skemaer for hhv. Brakvandssøen og Klydesøen.

1999: Skemaer for hhv. Brakvandssøen og Klydesøen.

YNGLEFUGLE-REGISTRERINGER

1995: Område I+II, IV og V

1996: do. samt VI

1997: Område I+II, IV+VI og V

1998-99: Område I, IV+VI og V