



Bornholm
Ref. MEJHO
Den 16. juli 2024

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL FORPAGTNING SJØLJAN

Kan arealerne betragtes som økologiske?

Arealerne er ikke i økologisk drift, men kan straksomlægges til økologi.

Når I skriver robuste dyr – hvad mener I så?

Der kan anvendes kvægracer, der betegnes som robuste. Det drejer sig om Galloway, Dexter, Skotsk Højlandskvæg, Angus, Hereford, Skovkvæg og Welsh Black.

Se evt. faktaark fra Miljøstyrelsen om robuste racer:

<https://mst.dk/media/114125/faktaark-om-robuste-husdyrracer2020.pdf>

Det er ok at anvende krydsninger mellem racerne. Det er også ok at have ikke-robuste racer krydset ind i dyrene – dog skal hvert enkelt individ være minimum 75% robust race.

Hvorfor vil I have robuste racer?

Vi stiller krav om robuste racer for at få en mere ekstensiv græsning, hvor dyrene også gerne går på de grovere græsser samt træer og buske. De robuste racer kan bedre omsætte næringen fra de mere næringsfattige arealer og er bedre egnede til at modstå det skiftende vejr.

Kan der afgræsses med andre dyrearter end kvæg?

Arealet er udbudt til afgræsning med robust kvæg, og skal være hovedafgræsningen på arealet.

Hvis der er et særligt behov, kan det efter konkret aftale med bortforpagter aftales at supplere med heste.

Hvorfor må dyrene ikke parasitbehandles på arealerne – og hvorfor skal de tilbageholdes?

Det er bevist, at medicin til parasitbehandling af husdyr har en negativ effekt på naturen.

Det skyldes at medicinen udvaskes fra pelsen og/eller udskilles i gødning og urin. På denne måde påvirkes fx de svampe og insekter, der er tilpasset livet i bl.a. husdyrgødning. Dels bliver gødningen uinteressant for insekterne, men medicinresterne kan også reducere insekternes udvikling og slå dem ihjel. Der er fx målt påvirkning af insekters udvikling i kvæggødning op til 77 dage efter behandling.

Da formålet med forpagtningen er at forbedre biodiversiteten på arealerne, er udskillelse af medicinrester på arealerne derfor ikke foreneligt med formålet. Dyrene skal derfor tilbageholdes fra arealerne så længe at risikoen for udskillelse af medicinrester er reduceret betragteligt.