



Naturmål for Fold 16

Dato for udarbejdelse: 14/01-2025

Dato for gennemgang med forpagter:

Evt. Revision:

Lokalitet

Folden er placeret på Kalvebod Fælled syd for Snogevej, nord for Birkestien og vest for Kanalvej.

Formålet med naturforvaltningen på arealet

Formålet med naturplejen/afgræsningen er at bevare det åbne landskab uden vedagtig vegetation. Desuden skal afgræsningen være så hård, at den forhindrer arealerne i at blive domineret af bjergørhvene, der tidligere har været meget dominerende på strandengene.

Den primære målsætning er, at bevare og forbedre forholdene for vadefugle, særligt brushøns og alm. ryle, men også at tage hensyn til de sjældne planter og padder der findes på strandengene.

Tilstand / beskrivelse af området

Arealet er inddæmmet i 1940'erne og dermed tidligere lavvandet havbund. Frem til 1990 blev der ikke foretaget egentlig naturforvaltning, så området udviklede sig til skov og krat samt med store tagrørsbevoksninger på de vådeste steder. Der er ryddet store arealer med skov og krat, og de hydrologiske forhold er forbedret ved tilkastning af grøfter.

Fold 16 er 11,5 ha. Stor og beliggende på Kalvebod Fælled, hvilket er et område som er fuldt ud beskyttet under Natura 2000 på grund af dets unikke naturtyper og biodiversitet. Folden er desuden registreret som strandeng, hvilket betyder, at det er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Denne beskyttelse sikrer bevarelse af områdets særlige økologiske værdier og sikrer, at naturen forbliver intakt.

Fold 16 har på nuværende tidspunkt en HNV-score på 7 og 8. Se kort.



Fokusarter

Alm. ryle

*Tekst: Er på
udpegningsgrundlaget*

*Er genindvandret som
ynglefugle efter 10 års
fravær.*



Brushøns.

*Er genindvandret som
ynglefugl efter 30 års
fravær*



Klyde.

*Er på
udpegningsgrundlaget.*

*Yngler på nyetablerede
yngleøer i Klydesø*



Grønbroget tudse.

Findes talrigt



Strandtudse

*Der er udsat ca. 3000 stk.
i 2018, 2019 og 2020,
hvor der også er etableret
mange paddehuller. I
foråret 2024 er der
registreret syngende
hanner*





Driftshistorie

Arealet har gradvist været under afgræsning fra 1990. KVL havde i starten belægnings- og raceforsøg i Klydesøområdet. Resultaterne viste, at en belægning på 1 Storkreatur/ha giver den bedste naturpleje, uden det går ud over dyrenes trivsel. Der er igennem tiden ryddet store arealer for skov og krat.

I fold 16 har der været afgræsset med robuste kvæg siden 90'erne.

Forvaltningstiltag

Engene afgræsses primært med kvæg, men også i mindre grad med heste. Der er krav til dyreholderne om, at det skal være hårdfører kvægracer eller blandingsracer. Minimum 1 storkreatur pr. ha. i minimum 4 mdr. af vækstsæsonen. Normalt kommer dyrene på græs omkring 1. maj og hjemtages 1. dec.

Tilskudsfodring er ikke tilladt.

Hvis der er partier med bjergrørhvene, forsøges de afbrændt om vinteren. Arealet afpudses for tjørn og havtorn med års mellemrum. Der arbejdes løbende med at forbedre de hydrologiske forhold, ved tilkastning af grøfter, og ændring af grøfteprofiler.

For at minimere prædation på de jordrugende fugles æg og unger fra ræv, foretages der regulering af ræve af frivillige jægere, både i form af gravjagt fra rævekunstgrave, og i form af selektiv afskydning ved brug af kald.

Planteliste - indikator for naturtilstand

Fløjlsgræs || *Holcus lanatus*
Gåsepotentil || *Argentina anserina*
Almindelig hvene || *Agrostis capillaris*
Hundesalat || *Leontodon saxatilis*
Kryb-hvene || *Agrostis stolonifera*
Hvid-kløver || *Trifolium repens*
Jordbær-kløver || *Trifolium fragiferum*
Smalbladet kællingetand || *Lotus tenuis*
Krybende potentil || *Potentilla reptans*
Eng-rapgræs (underart) || *Poa pratensis* subsp. *pratensis*
Bjerg-rørhvene || *Calamagrostis epigejos*
Fladstrået siv || *Juncus compressus*
Glanskapslet siv || *Juncus articulatus*
Knop-siv || *Juncus conglomeratus*
Kær-snerre || *Galium palustre*
Almindelig star (varietet) || *Carex nigra* var. *nigra*
Blågrøn star || *Carex flacca*
Fjernakset star || *Carex distans*



Rød svingel || Festuca rubra
Tagrør || Phragmites australis
Tandbælg || Danthonia decumbens
Grå-pil || Salix cinerea
Vorte-birk || Betula pendula
Eng-rørhvene || Calamagrostis canescens
Krybende pil (varietet) || Salix repens var. repe

Evaluering

NST Evaluering:

Græsningstrykket vurderes løbende, hvor en eventuelt partiel slåning af vedagtig vegetation afgøres.

Evaluering via eksterne data:

Der kan indhentes data fra:

NOVANA overvågning.

HNV- og biodiversitetsscoren for arealet vurderes

Der indhentes data om sjældne arter fra pas på kortet, Biodiversitetskortet, fugleognatur eller artsportalen



Kort

Oversigtskort på luftfoto





Natura 2000 kort





HNV-kort

